

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE		
ASSUNTO: ALIMENTAÇÃO POR SOG/SNG COM TÉCNICA DE GAVAGEM		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1. Promover a administração da alimentação, hidratação e medicação aos pacientes inconscientes ou impossibilitados de deglutir.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1. Seguir o horário prescrito para administrar a dieta.</p> <p>2.2. Avaliar aspecto, quantidade e características do resíduo gástrico antes da administração da dieta.</p> <p>2.3. Observar a presença da distribuição gástrica.</p> <p>2.4. Avaliar a presença de dispnéia ou taquipnéia durante o procedimento</p> <p>2.5. Não permitir o gotejamento rápido.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1. Frasco com a dieta prescrita;</p> <p>3.2. 1 seringa de 20 ml;</p> <p>3.3. 1 equipo para alimentação;</p> <p>3.4. 1 Estetoscópio</p> <p>3.4. Copo com água potável;</p> <p>3.5. Par de luvas de procedimento;</p> <p>3.6. Prontuário.</p>		
<p>Responsável: Enfermeiro ou Téc de Enfermagem</p>	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Higienizar as mãos;</p> <p>4.2. Reunir o material e levá-lo próximo ao leito do paciente;</p> <p>4.3. Colocar o paciente em posição de Fowler (45°) para facilitar a introdução da dieta, caso não haja contra-indicação;</p> <p>4.4. Calçar as luvas;</p> <p>4.5. Conectar o equipo ao frasco da dieta;</p> <p>4.6. Retirar o ar do equipo;</p> <p>4.7. Explicar o procedimento ao paciente/acompanhante;</p> <p>4.8. Conferir o horário, rótulo e aspecto da dieta;</p>	

<p style="text-align: center;">Responsável: Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem</p>	<p>4.9. Verificar a temperatura da dieta;</p> <p>4.10. Colocar o frasco da dieta no suporte do soro;</p> <p>4.11. Certificar-se do posicionamento correto da sonda;</p> <p>4.12. Conectar a sonda ao equipo do frasco da dieta;</p> <p>4.13. Abrir o rolete do equipo e controlar o gotejamento que deverá ser constante, lento (gota a gota);</p> <p>4.14. Observar a reação do paciente;</p> <p>4.15. Lavar a sonda injetando água para remover os resíduos com o uso da seringa, após o término da introdução da dieta/medicação;</p> <p>4.16. Fechar a sonda;</p> <p>4.17. Manter a cabeceira elevada por mais de 30 minutos na posição Fowler após a administração da dieta;</p> <p>4.18. Manter a unidade limpa e organizada;</p> <p>4.19. Higienizar as mãos.</p> <p>4.20. Registrar o procedimento no prontuário.</p>
<p>Sigla: ASOG/SNG</p>	<p>Página: 2 de 2</p>

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M. I. S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

CRUZ, A. P. (org.) **Curso Didático de Enfermagem**: Módulo 1. São Paulo: Yendis Editora, 2006.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Alimentação por SOG/SNG com Técnica de Lavagem GE- ASOG/SNG/018

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
GE –ASOG/SNG/018	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---