

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE		
ASSUNTO: AUXÍLIO NA RETIRADA DO DRENO TORÁCICO		
1. Objetivo: 1.1. Retirar dreno torácico.		
2. Considerações Gerais: 2.1. Manter curativo oclusivo por 48 horas para minimizar a possibilidade de entrada de ar através da parede torácica. Observar curativo e informar em caso de líquido drenando ou descolamento. 2.2. Observar padrão respiratório do paciente e comunicar a presença de alterações dos sinais vitais e saturação de Oxigênio.		
3. Materiais Necessários 3.1. Bandeja; 3.2. Gaze estéril; 3.3. Caixa de instrumental; 2.4. Luva de procedimento; 2.5. Caixa de pequena cirurgia; 2.6. 01 lâmina de bisturi; 2.7. PVPI ou clorexidina; 2.8. Espadrado ou fita hipoalergênica; 2.9. Biombo.		
. PROCEDIMENTO 4.1. Higienizar as mãos; 4.2. Reunir material na bandeja e levar para o quarto do paciente; 4.3. Orientar paciente sobre o procedimento; 4.4. Administrar analgesia conforme prescrição médica, antes de iniciar o procedimento; 4.5. Colocar biombo para proporcionar privacidade ao paciente; 4.6. Posicionar paciente em decúbito lateral ou dorsal, expondo o lado da drenagem torácica; 4.7. Higienizar novamente as mãos;		

<p style="text-align: center;">Responsável: Enfermeiro (a), técnico de enfermagem</p>	<p>4.8. Auxiliar o médico, abrindo o material solicitado sobre superfície limpa e sem contaminação;</p> <p>4.9. Preparar curativo oclusivo com esparadrapo largo e gases antes da retirada do dreno;</p> <p>4.10. Fazer antisepsia com PVPI a 10% no local de inserção do dreno;</p> <p>4.11. Retirar a sutura cortando o fio com lâmina de bisturi;</p> <p>4.12. Orientar paciente a inspirar profundamente e prender a respiração durante a retirada do dreno;</p> <p>4.13. Tracionar dreno com movimento circular e colocar imediatamente curativo oclusivo;</p> <p>4.14. Manter curativo oclusivo por 48h. Registrar data, hora e assinatura do responsável pelo procedimento;</p> <p>4.15. Deixar paciente em posição confortável;</p> <p>4.16. Retirar material e manter a unidade em ordem;</p> <p>4.17. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e passar álcool a 70%;</p> <p>4.18. Higienizar as mãos;</p> <p>4.19. Registrar procedimento realizado, registrando aspecto do local da inserção do dreno, no prontuário do paciente;</p> <p>4.20. Atentar para o padrão respiratório do paciente e comunicar o médico se presença de alterações dos sinais vitais e saturação de oxigênio.</p>
<p>Sigla: ARDT</p>	<p style="text-align: right;">Página: 2 de 2</p>

REFERÊNCIA

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Auxílio na Retirada do Dreno Torácico GE- ARDT/027

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
GE – ARDT/027	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Skirley Fragozo Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---