

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH		
ASSUNTO: COLETA DE URINA PARA UROCULTURA (CULTURA DE URINA)		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1. Investigar infecção no trato urinário.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1. Proceder da mesma forma descrita na coleta de urina EAS (POP 041);</p> <p>2.2. Todas as amostras devem ser refrigeradas, se houver demora no transporte para o laboratório ou cultivo não ocorrer imediatamente.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>2.1. 02 pares de luvas estéreis, o primeiro par para realizar a lavagem da região periuretral, e o segundo para manipular o frasco com que se vai coletar a amostra;</p> <p>2.2. Frasco coletor estéril;</p> <p>2.3. PVPI degermante e tópico ou clorexidina tópica e degermante.</p>		
Responsável Enfermeiro	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Coleta de urina feminina</p> <p>a) Lavar as mãos com água e sabão, secá-la com papel toalha, calçar as luvas estéreis;</p> <p>b) Com uma das mãos afastar os grandes lábios e mantê-los afastados enquanto limpa a região genital com a gaze estéril embebida em PVPI tópico no sentido do centro para trás (para cada lado usar gazes novas);</p> <p>c) Secar a região com gaze estéril;</p> <p>d) Tampar o coletor adequadamente.</p>	

	<p>4.2. Coleta de urina masculina</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lavar as mãos com água e sabão, secá-la com papel toalha, calçar as luvas estéreis; b) Retrair o prepúcio, se necessário; c) Limpar a glande e meato com PVPI tópico e secar com gaze estéril; d) Colher o jato médio desprezando-se o primeiro e o último jato de urina; e) Tampar o coletor adequadamente. <p>4.3. Coleta de urina em criança:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lavar as mãos com água e sabão, secá-la com papel toalha, calçar as luvas estéreis; b) Fazer assepsia dos genitais externos conforme sexo da criança e colocar o coletor urinário pediátrico sobre a genitália; c) Efetuar a troca do coletor com intervalo de 30 a 40 minutos, sempre precedido de uma nova assepsia. <p>4.4. Cateterismo vesical:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Clampear o equipo da bolsa coletora; b) Realizar antisepsia com sabão líquido no látex do equipo do coletor urinário; c) Coletar a urina com uma seringa e agulha puncionando o local; d) Transferir o material para um recipiente estéril e enviar ao laboratório.
<p>Sigla CUU</p>	<p>Página 2 de 2</p>

REFERÊNCIA:

CARMAGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Manual de Procedimentos em Microbiologia Clínica**. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. SET/2000

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Coleta de Urina para Urocultura (Cultura de Urina) CCIH-CUU/043

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
CCIH -CUU/043	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCIH</i> <i>COREN:98226</i>	Verificado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
--	---	--