

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 1										
ÁREA EMITENTE: Gerência do Ambulatório												
ASSUNTO: Troca de bolsa de colostomia/ileostomia												
1. Objetivo: Manter colostomia/ileostomia limpa e livre de processos infecciosos.												
2. Materiais Necessários <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1.1 01 par de luvas estéreis;</td> <td style="width: 33%;">2.6 02 pacotes de gazes;</td> </tr> <tr> <td>1.2 01 par de luvas de procedimentos;</td> <td>2.7 S.F.à 0,9%</td> </tr> <tr> <td>1.3 01 Bolsa de colostomia de 01 ou 02 peças;</td> <td>2.8 01 lâmina de bisturi ;</td> </tr> <tr> <td>1.4 01 régua para mensuração de colostomia;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5 Pó Stomaesive ou Cavlon Spray;</td> <td></td> </tr> </table>			1.1 01 par de luvas estéreis;	2.6 02 pacotes de gazes;	1.2 01 par de luvas de procedimentos;	2.7 S.F.à 0,9%	1.3 01 Bolsa de colostomia de 01 ou 02 peças;	2.8 01 lâmina de bisturi ;	1.4 01 régua para mensuração de colostomia;		1.5 Pó Stomaesive ou Cavlon Spray;	
1.1 01 par de luvas estéreis;	2.6 02 pacotes de gazes;											
1.2 01 par de luvas de procedimentos;	2.7 S.F.à 0,9%											
1.3 01 Bolsa de colostomia de 01 ou 02 peças;	2.8 01 lâmina de bisturi ;											
1.4 01 régua para mensuração de colostomia;												
1.5 Pó Stomaesive ou Cavlon Spray;												
Responsável: Enfermeiro / Médico	3. Procedimento <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Preparar todo o material; 3.2 Higienizar as mãos; 3.3 Orientar paciente e acompanhante quanto ao procedimento a ser realizado; 3.4 Posicionar o paciente na maca; 3.5 Calçar luvas de procedimentos; 3.6 Retirar bolsa de colostomia do paciente; 3.7 Retirar luvas de procedimentos; 3.8 Higienizar as mãos; 3.9 Abrir S.F à 0,9% 3.10 Abrir pacote de luvas estéreis, e colocar dentro, gazes com técnica adequada 3.11 Calçar luvas estéreis; 3.12 Limpar colostomia com S.F.0,9%, assim como a área pericostomia; 3.13 Secar pele ao redor com gaze; 3.14 Medir diâmetro do estoma para escolha da bolsa de colostomia; 3.15 Avaliar pele ao redor da colostomia; 3.16 Caso a pele não esteja íntegra: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Dermatite leve ou hiperemia</u>: aplicar o pó stomahesive e bolsa de colostomia de (sistema de 02 peças) ou aplicar bolsa colostomia de resina recortável (sistema de 01 peça); b. <u>Dermatite severa</u>: aplicar pasta e pó a base de hidrocolóide e aplicar bolsa coletora com placa de hidrocolóide (sistema de 02 peças) ou bolsa coletora de resina recortável (sistema de 01 peça); 3.17 Caso a pele esteja íntegra: aplicar bolsa colostomia de resina recortável (sistema de uma peça) ou bolsa colostomia com placa de hidrocolóide (sistema de duas peças); 3.18 Retirar todo o material usado, separando perfuro-cortantes dos demais, e eliminando cada um em local adequado; 3.19 Retirar as luvas; 3.20 Higienizar as mãos; 3.21 Solicitar cartão da Instituição do paciente e colocar seus dados na APAC com a descrição 'Troca de Colostomia' ou 'Troca de bolsa de Ileostomia', número do prontuário do cliente e CID, de acordo com prescrição médica. Anotar também, na ficha de produção diária. 3.22 Entregar cartão ao paciente. 											
Sigla GA – TBC	Página 1 de 1											

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Troca de bolsa de colostomia/ileostomia GA – TBC/07

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
GA – TBC/07	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Maura Andrea Negreiros</i> <i>Gerente do Ambulatório</i> <i>COREN: 459262</i>	Verificado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	---	---