

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP	Página: 1 de 3
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM – GE		
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA OCULAR		
1. Objetivo:		
<p>1.1. Administrar medicamentos por via oftálmica para auxílio no tratamento por ação local e no exame oftalmológico.</p> <p>1.2. Corrigir disfunções dos músculos do olho.</p>		
2. Considerações gerais:		
<p>2.1. Recomenda-se que o frasco do medicamento seja de uso individual;</p> <p>2.2. Evitar o contato do material com as conjuntivas do cliente. Em caso de contato, descartar o produto;</p> <p>2.3. Verificar e respeitar validade do medicamento;</p> <p>2.4. Anotar qualquer reação medicamentosa que possa ocorrer.</p>		
3. Materiais Necessários:		
<p>3.1. Bandeja;</p> <p>3.2. Medicamento prescrito;</p> <p>3.3. Lenços de papel ou gaze;</p> <p>3.4. Conta-gotas;</p> <p>3.5. Bacia com água morna e toalha de rosto (caso paciente apresente crostas ou secreções);</p> <p>3.6. Luvas de procedimento.</p>		
Responsável Equipe de enfermagem	4. PROCEDIMENTO:	
	<p>4.1. Verificar prescrição médica, atentando para nome do paciente, fármaco, dosagem, via de administração e hora;</p> <p>4.2. Identificar frasco com nome do paciente e leito ou registro do paciente;</p> <p>4.3. Reunir material em uma bandeja;</p> <p>4.4. Higienizar as mãos;</p> <p>4.5. Explicar o procedimento ao cliente, orientando sobre o medicamento a ser administrado;</p> <p>4.6. Colocar paciente sentado ou elevar a cabeceira do leito;</p> <p>4.7. Higienizar as mãos;</p> <p>4.8. Calçar luva de procedimento;</p> <p>4.9. Lavar e secar no sentido do canto interno para o canto externo do olho;</p> <p>4.10. Solicitar para o paciente que incline a cabeça para trás (se possível);</p> <p>4.11. Afastar a pálpebra inferior, com os dedos e uma gaze;</p> <p>4.12. Solicitar ao paciente que olhe para cima (se possível);</p> <p>4.13. Para aplicar o colírio: a) Com a mão dominante sobre a fronte do paciente, pingar a quantidade de gotas prescritas, aproximadamente 1 a 2 cm acima do saco conjuntival, tendo o cuidado de não tocar na conjuntiva do cliente; b) Caso o paciente feche os olhos, pisque ou a gota caia fora da margem externa da pálpebra, repetir o procedimento; c) Secar o excesso de medicamento com um lenço de papel.</p> <p>4.14. Para aplicar pomadas: a) Aplicar uma fina camada de pomada em todas a extensão do fórnix inferior, sem tocar a ponta da bisnaga na conjuntiva do paciente; b) Limpe o excesso com gaze; c) Solicitar ao cliente que permaneça com os olhos fechados por alguns minutos após a aplicação da pomada.</p> <p>4.15. Recolher o material e colocá-lo na bandeja;</p> <p>4.16. Encaminhar os resíduos para o expurgo;</p> <p>4.17. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel-toalha e higienizar com álcool 70%;</p> <p>4.18. Higienizar as mãos;</p> <p>4.19. Checar horário de administração do medicamento na prescrição médica ou circular o horário da medicação caso ele não seja administrado, registrando o motivo.</p>	
Sigla: AMVO	Página: 2 de 3	

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. **Fundamentos de enfermagem**. 7^A ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Administração de Medicamentos via Ocular GE- AMVO/09

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
GE- AMVO 09	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:
<i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	<i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	<i>Skirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>