

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: UTI ADULTO		
ASSUNTO: TROCA DE FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1. Evitar refluxo do líquido drenado, prevenir infecção e medir o volume drenado.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1. Evitar trocar o sistema coletor de drenagem torácica.</p> <p>2.2. Mensura-se e esvazia-se o frasco quando necessário, ou pelo menos a cada 24 horas, e reutiliza-se o frasco para o mesmo paciente, desde que seja realizada a técnica asséptica e se utilize água estéril para refazer o selo d'água.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1. Bandeja;</p> <p>3.2. Água estéril;</p> <p>3.3. Esparadrapo ou fita hipoalergênica;</p> <p>3.4. Frasco de drenagem de tórax;</p> <p>3.5. Luvas de procedimento;</p> <p>3.6. Gazes;</p> <p>3.7. Pinças (Kocker ou Kelly).</p>		
Responsável Enfermeiro	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Higienizar as mãos;</p> <p>4.2. Providenciar material necessário;</p> <p>4.3. Calçar as luvas de procedimento;</p> <p>4.4. Preparar o frasco coletor no posto de enfermagem;</p> <p>4.3. Colocar água esterilizada no frasco até assegurar a imersão de 2 cm no fundo do frasco coletor;</p> <p>4.4. Prender no frasco uma fita em posição vertical, e marcar o nível de água com um traço (caso o frasco não tenha a medida centimetrada), anotando a hora e a data da troca.</p> <p>4.5. Reunir o material em badeja e levar para o quarto do paciente;</p>	

Responsável Enfermeiro	<p>4.6. Orientar paciente sobre o procedimento;</p> <p>4.7. Higienizar novamente as mãos;</p> <p>4.8. Pinçar o dreno próximo ao tórax, com pinça de Kocker ou Kelly;</p> <p>4.9. Retirar o copo do frasco e colocar imediatamente o novo copo do frasco já preparado, observando se está bem fechado;</p> <p>4.10. Retirar a pinça com o frasco de drenagem abaixo do nível do tórax paciente;</p> <p>4.11. Observar se há oscilação e drenagem e, se necessário, faça uma ordenha na extensão;</p> <p>4.12. Posicionar o frasco, para evitar formação de alças (cotovelo) e colocar sob a cama, abaixo do nível do tórax (60 a 90 cm) e devidamente protegido de quedas acidentais;</p> <p>4.13. Medir volume drenado do frasco retirado;</p> <p>4.14. Retirar as luvas de procedimento;</p> <p>4.15. Recolher material, mantendo a unidade organizada;</p> <p>4.16. Encaminhar material permanente para o expurgo;</p> <p>4.17. Lavar bandeja com água e sabão, secar com papel-toalha e passar álcool a 70%;</p> <p>4.18. Higienizar as mãos;</p> <p>4.19. Checar e registrar procedimento realizado.</p>
Sigla TFDT	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. **Fundamentos de Enfermagem**. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Troca de Frasco de Drenagem Torácica UTI ADUL- TFDT/094

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
UTI ADUL -TFDT/094	SETEMBRO/2023	2023/2026	JANEIRO/2026	03

Elaborado por: Skirley Fragoso Monteiro <i>Chefe de Departamento de Enfermagem</i> COREN: 98228	Verificado por: Fabiana Souza Moreira <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> COREN:89315	Aprovado por: Glauciane Moreira Neves <i>Presidente da CCJH</i> COREN:98226
--	---	--