

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH		
ASSUNTO: TÉCNICA DE CURATIVO (Colostomia, ileostomia)		
1. Objetivo: Prevenir infecções em colostomia e ileostomia.		
<p>2. Materiais Necessários</p> <p>2.1 CM</p> <p>2.2 Gazes estéreis</p> <p>2.3 S. F. 0,9 %</p> <p>2.4 Esparadrapo ou fita hipoalergênica</p> <p>2.5 Luvas de procedimento</p> <p>2.6 Bolsa coletora</p> <p>2.7 Tesoura</p> <p>2.8. Pó, pasta ou placa regeneradora, se necessário</p>		
<p>3. Considerações Gerais</p> <p>a. Utilizar a placa protetora desde o primeiro curativo a fim de prevenir lesões do epitélio peri-ostomal;</p> <p>b. Deve-se abrir o "camp" na parte inferior esvaziar e lavar a bolsa, sempre que necessário;</p> <p>c. Se houver lesão peri-ostomal, aplicar pó regenerador cutâneo e/ou placa protetora antes de colocar a bolsa coletora. Se necessário, aplicar a pasta de correção de imperfeições do ostoma;</p> <p>d. Ao realizar a troca da bolsa, verificar se não há necrose, dermatite peri-ostomal, edema, infecção, hemorragia retração, colapso, ou distensão abdominal;</p> <p>e. Realizar a troca das bolsas simples a cada 24 horas ou sempre que necessário;</p> <p>f. Realizar a troca da bolsa com placa protetora com 7 dias ou quando perder a aderência ou houver extravasamento de secreções.</p>		
<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1 Higienizar as mãos;</p> <p>4.2 Reunir todo o material, e levá-lo próximo ao leito do paciente;</p> <p>4.3 Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado;</p> <p>4.4 Manter o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada;</p>		

Responsáveis Enfermeiros, técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem	<p>4.5 Colocar as pinças com os cabos voltados para as bordas do campo;</p> <p>4.6 Abrir o pacote de curativo do paciente, com técnica asséptica;</p> <p>4.7 Calçar as luvas;</p> <p>4.8 Manter a pinça kelly ou pean com gaze e umedecê-la com S.F. 0.9%;</p> <p>4.9 Limpar a região periosmal. Proteger a ostomia com gaze, para impedir a drenagem de secreções;</p> <p>4.10 Secar a região com gaze;</p> <p>4.11 Medir a ostomia, demarcar e recortar a placa no tamanho necessário;</p> <p>4.12 Utilizar o pó, pasta ou placa regeneradora quando houver periosmais;</p> <p>4.13 Acoplar a bolsa à placa e camplar na parte inferior da bolsa (quando utiliza a bolsa com drenagem). Retirar a bolsa coletora simples ou da placa e fixar ao redor do estoma;</p> <p>4.14 Retirar as luvas;</p> <p>4.15 Deixar o paciente confortável e a unidade em ordem;</p> <p>4.16 Lavar as mãos;</p> <p>4.17 Anotar o relatório de enfermagem, o procedimento a ser realizado e as características da ostomia.</p>
Sigla TCCI	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS

- JORGE, S. A. et al. **Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas**. São Paulo. Editora Atheneu, 2003.
- CARMAGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem: Guia prático**. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011.
- IRION, G. **Feridas: Novas Abordagens, Manejo Clínico e Altas em Cores**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Técnica de Curativo (Colostomia, Ileostomia) CCIH – TCCI/108

Rev:03

Código CCIH – TCCI/108	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
Elaborado por: <i>Glauceane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Verificado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>		

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida reprodução.