

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: : COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH		
ASSUNTO: PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM SUSPEITA/ CONFIRMAÇÃO DE COVID-19		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1. Padronizar o processo de paramentação e desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para assistência ao paciente, no atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados da COVID-19, nas diversas áreas de internação.</p>		
<p>2. Materiais Necessários:</p> <p>2.1. Avental;</p> <p>2.2. Gorro/Touca descartável;</p> <p>2.3. Luvas de procedimentos ou estéreis (conforme procedimento a ser realizado);</p> <p>2.4. Máscaras cirúrgicas;</p> <p>2.5. Máscaras PFF2;</p> <p>2.6. Óculos de proteção e/ ou protetor facial;</p> <p>2.7. Sabonete líquido e papel toalha;</p> <p>2.8. Álcool em gel ou líquido.</p>		
<p>3. Considerações Gerais:</p> <p>3.1. Os profissionais de saúde devem utilizar EPIs durante a assistência direta aos pacientes ou no contato com superfícies e materiais/produtos utilizados pelo paciente ou por seus acompanhantes/visitantes.</p> <p>3.2. Deve-se evitar tocar com as mãos, com luvas ou outros EPIs contaminados as superfícies próximas ao paciente (ex. mobiliário e equipamentos para a saúde), assim como, as áreas fora do ambiente próximo ao paciente.</p>		
Responsável: Equipe Multiprofissional	<p>4. PROCEDIMENTO:</p> <p>4.1 COLOCAÇÃO DE EPIs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar adornos, objetos pessoais ou clínicos (brinco, anel, pulseira, relógio, estetoscópio); • Higienizar as mãos com água e sabão ou solução alcoólica; • Colocar a máscara cirúrgica ou máscara tipo PFF2; • Colocar a touca descartável, cobrindo os pavilhões auriculares; • Colocar os óculos de proteção ou protetor facial; • Colocar avental; • Colocar o primeiro par de luvas, por cima do punho; • Colocar o segundo par de luvas, por cima do punho, na prestação direta da assistência ao paciente. 	

Responsável: Equipe Multiprofissional	<p>4.2 RETIRADA DE EPIs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar par de luvas; • Desfazer as amarras do avental; • Puxar o avental, na altura dos ombros, fazendo menor volume; • Retirar o avental e luvas ao mesmo tempo; • Desprezar em lixo infectante; • Higienizar as mãos com água e sabão ou solução alcoólica; • Retirar óculos de proteção ou protetor facial, utilizando as hastes laterais, e colocar em depósito próprio; • Retirar touca descartável, de trás para frente, e desprezar lixo infectante; • Higienizar as mãos com água ou solução alcoólica; • Retirar máscara PFF2 ou máscara cirúrgica; • Higienizar as mãos com água ou solução alcoólica.
Sigla: PADPC	Página: 2 de 2

Referencia:

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Orientações para serviço de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (SARSCoV-2. Atualizada em 31/03/2020.

ANEXO

COLOCAÇÃO DE EPIs

USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA
PACIENTE SUSPEITO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)⁽²⁾

COLOCAÇÃO DE EPI

1º



Reunir os materiais necessários:

- AVENTAL IMPERMEÁVEL
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO ou PROTETOR FACIAL
- TOUCA DESCARTÁVEL
- MÁSCARA PFF2
- 2 PARES DE LUVAS.

2º



REMOVER
quaisquer adornos ou
objetos pessoais ou
clínicos⁽²⁾

CABELOS DEVEM ESTAR PRESOS.
HOMENS DEVEM ESTAR SEM BARBA.

3º



HIGIENIZAR as mãos
com água e sabão ou
solução alcoólica

4º



Colocar MÁSCARA
PFF2⁽³⁾

ADJUSTAR O CIP NASAL E FAZER
TESTE DE VEDAÇÃO.⁽⁴⁾

5º



Colocar TOUCA
descartável

COBRIR PAVILHÕES AURICULARES.

6º



Colocar ÓCULOS DE
PROTEÇÃO ou
PROTETOR FACIAL

7º



Vestir AVENTAL
IMPERMEÁVEL

PRENDER AS AMARRAS
LATERALMENTE.

8º



Colocar primeiro par
de LUVAS

POR CIMA DO PUNHO DO AVENTAL.

9º



Colocar segundo par
de LUVAS⁽⁵⁾

POR CIMA DO PUNHO DO AVENTAL.

ANEXO II

RETIRADA DE EPIS

USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA
PACIENTE SUSPEITO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)⁽¹⁾

RETIRADA DE EPI

<p>1º</p>  <p>DESFAZER AS AMARRAS. PUXE O AVENTAL NA ALTURA DOS OMBROS, FAZENDO MENOR VOLUME POSSÍVEL. DESPREZAR NO LIXO INFECTANTE.</p> <p>Remover AVENTAL IMPERMEÁVEL e par de LUVAS</p>	<p>2º</p>  <p>HIGIENIZAR as mãos com água e sabão ou solução alcoólica</p>	<p>3º</p>  <p>UTILIZAR HASTES LATERAIS. ACONDICIONAR EM DEPÓSITO PRÓPRIO.⁽²⁾</p> <p>Retirar ÓCULOS DE PROTEÇÃO ou PROTETOR FACIAL</p>	<p>4º</p>  <p>HIGIENIZAR as mãos com água e sabão ou solução alcoólica</p>
<p>5º</p>  <p>Retirar TOUCA descartável</p> <p>DE TRÁS PARA FRENTE. DESPREZAR EM LIXO INFECTANTE</p>	<p>6º</p>  <p>HIGIENIZAR as mãos com água e sabão ou solução alcoólica</p>	<p>7º</p>  <p>Retirar MÁSCARA PFF2⁽³⁾</p> <p>UTILIZAR AS TIRAS. NÃO TOCAR NO FILTRO. ARMAZENAR DENTRO DO PAPEL.</p>	<p>8º</p>  <p>HIGIENIZAR as mãos com água e sabão ou solução alcoólica</p>

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM SUSPEITA/ CONFIRMAÇÃO DE COVID-19/121

Rev:02

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
CCIH – TCD/107	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:
<i>Glauceane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	<i>Skirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	<i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>