

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 026 – SCIH – FCECON Página: 1/5	
Título do Documento	PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO ATENDIMENTO À PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: PDAPSCC19

Elaboração: Enfª Marielle Colares Magalhães Martins Coordenadora da CCIH	
Revisão: Drª Silvia Souza Infectologista da CCIH	
Aprovação: Drª Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira Diretora Técnica da Fcecon	

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 026 – SCIH - FCECON Página: 2/5	
Título do Documento	PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO ATENDIMENTO À PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: PDAPSCC19

1. OBJETIVOS:

1.1. Padronizar o processo de paramentação e desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para assistência ao paciente, no atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados da COVID-19, nas diversas áreas de internação.

2. FINALIDADES:

2.1. Os profissionais de saúde devem utilizar EPIs durante a assistência direta aos pacientes ou no contato com superfícies e materiais/produtos utilizados pelo paciente ou por seus acompanhantes/visitantes.

2.2. Deve-se evitar tocar com as mãos, com luvas ou outros EPIs contaminados as superfícies próximas ao paciente (ex. mobiliário e equipamentos para a saúde), assim como, as áreas fora do ambiente próximo ao paciente.

3. MATERIAIS:

- 3.1. Avental;
- 3.2. Gorro/Touca descartável;
- 3.3. Luvas de procedimentos ou estéreis (conforme procedimento a ser realizado);
- 3.4. Máscaras cirúrgicas;
- 3.5. Máscaras PFF2;
- 3.6. Óculos de proteção e/ ou protetor facial;
- 3.7. Sabonete líquido e papel toalha;
- 3.8. Álcool em gel ou líquido.

4. RESPONSÁVEL:

4.1. Todos os profissionais de saúde.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

5.1. COLOCAÇÃO DE EPIs:

- Retirar adornos, objetos pessoais ou clínicos (brinco, anel, pulseira, relógio, estetoscópio);
- Higienizar as mãos com água e sabão ou solução alcoólica;

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 026 – SCIH - FCECON Página: 3/5	
Título do Documento	PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO ATENDIMENTO À PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: PDAPSCC19

- Colocar a máscara cirúrgica ou máscara tipo PFF2;
- Colocar a touca descartável, cobrindo os pavilhões auriculares;
- Colocar os óculos de proteção ou protetor facial;
- Colocar avental;
- Colocar o primeiro par de luvas, por cima do punho;
- Colocar o segundo par de luvas, por cima do punho, na prestação direta da assistência ao paciente.

5.2. RETIRADA DE EPIs

- Retirar par de luvas;
- Desfazer as amarras do avental;
- Puxar o avental, na altura dos ombros, fazendo menor volume;
- Retirar o avental e luvas ao mesmo tempo;
- Desprezar em lixo infectante;
- Higienizar as mãos com água e sabão ou solução alcoólica;
- Retirar óculos de proteção ou protetor facial, utilizando as hastes laterais, e colocar em depósito próprio;
- Retirar touca descartável, de trás para frente, e desprezar lixo infectante;
- Higienizar as mãos com água ou solução alcoólica;
- Retirar máscara PFF2 ou máscara cirúrgica;
- Higienizar as mãos com água ou solução alcoólica.

4. REFERÊNCIA:

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020. Orientações para serviço de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (SARSCoV-2. Atualizada em 31/03/2020.

ANEXO I: PARAMENTAÇÃO:

USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA
PACIENTE SUSPEITO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)⁽¹⁾

COLOCAÇÃO DE EPI

1º



Reunir os materiais necessários:

- AVENTAL IMPERMEÁVEL
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO ou PROTETOR FACIAL
- TOUCA DESCARTÁVEL
- MÁSCARA PFF2
- 2 PARES DE LUVAS.

2º



REMOVER
quaisquer adornos ou
objetos pessoais ou
clínicos⁽²⁾

CAIBIÇOS DE VIM E ESTAR PRESOS.
HOMENS DEVEM ESTAR SEM BARRA.

3º



HIGIENIZAR as mãos
com água e sabão ou
solução alcoólica

4º



Colocar MÁSCARA
PFF2⁽³⁾

AJUSTAR O CLIP NASAL E FAZER
TESTE DE VEDAÇÃO.⁽⁴⁾

5º



Colocar TOUCA
descartável

COBRIR PAVILHÕES AURICULARES.

6º



Colocar ÓCULOS DE
PROTEÇÃO ou
PROTETOR FACIAL

7º



Vestir AVENTAL
IMPERMEÁVEL

PRENDER AS AMARRAS
LATERALMENTE.

8º



Colocar primeiro par
de LUVAS

POR CIMA DO PUNHO DO AVENTAL.

9º



Colocar segundo par
de LUVAS⁽⁵⁾

POR CIMA DO PUNHO DO AVENTAL.

ANEXO II: DESPARAMENTAÇÃO:

USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA
PACIENTE SUSPEITO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)⁽¹⁾

RETIRADA DE EPI

1º



DESFAZER AS AMARRAS.
PUXE O AVENTAL NA ALTURA DOS OMBROS,
FAZENDO MENOR VOLUME POSSÍVEL.
DESPREZAR NO LIXO INFECTANTE.

**Remover AVENTAL
IMPERMEÁVEL e par
de LUVAS**

2º



**HIGIENIZAR as mãos
com água e sabão ou
solução alcoólica**

3º



UTILIZAR HASTES LATERAIS.
ACONDITIONAR EM DEPÓSITO PRÓPRIO.⁽²⁾

**Retirar ÓCULOS DE
PROTEÇÃO ou
PROTETOR FACIAL**

4º



**HIGIENIZAR as
mãos com água e
sabão ou solução
alcoólica**

5º



**Retirar TOUCA
descartável**

DE TRÁS PARA FRENTE.
DESPREZAR EM LIXO INFECTANTE

6º



**HIGIENIZAR as mãos
com água e sabão ou
solução alcoólica**

7º



**Retirar MÁSCARA
PFF2⁽³⁾**

UTILIZAR AS TIRAS.
NÃO TOCAR NO FILTRO.
ARMAZENAR DENTRO DO PAPEL.

8º



**HIGIENIZAR as mãos
com água e sabão ou
solução alcoólica**