


# BUNDLE DE IPCSL

Infecção de Corrente Sanguínea  
Laboratorial



**Higienização das mãos**

**Curativo transparente datado, bem fixado e de fácil visualização do óstio**

**Barreira máxima, com campo fenestrado que cubra todo o corpo do paciente**

**Uso de EPIs completos**

**Degermação da pele com clorexidina 2%. Antissepsia da pele com solução alcóolica.**

**Flushing e fricção do conector valvulado com álcool à 70%**



**FCECON**

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA  
DO ESTADO DO AMAZONAS

Secretaria de  
**Saúde**



**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

 **Rua Francisco Orellana, 215,  
Planalto. CEP: 69040-010  
Manaus**

 **(92) 3024-0420**

**email:**

**[ccih@fcecon.am.gov.br](mailto:ccih@fcecon.am.gov.br)**



**Comissão de Controle de  
Infecções Relacionadas à  
Assistência à Saúde**

# BUNDLES

DE PREVENÇÃO DE IRAS



# BUNDLES

Constituem-se em pacotes de Boas Práticas de medidas e estratégias de evidência científicas presente nos Guidelines internacionais que visam, principalmente, a diminuição das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)

(Secretária de Saúde)

## BUNDLE DE ISC

**Infecção de Sítio Cirúrgico**



**Higiene das mãos**

**Controle dos níveis glicêmicos**

**Antibiótico profilaxia seguindo o protocolo institucional**

**Realizar tricotomia somente se necessário, antes da cirurgia.**

**Degermação do membro ou local da incisão antes da solução antisséptica**

**Antissepsia cirúrgica conforme POP institucional**

**Realizar curativos e desprezo de drenos cirúrgicos**

## BUNDLE DE PAV

**Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica**



**Higiene das mão**

**Manter cabeceira elevada entre 30° a 40°**

**Aspiração de traqueal de forma asséptica**

**Manter pressão do cuff entre 20-25 cmH2O**

**Higiene oral com clorexidina à 12%**

**Manter circuito sem sujidade ou condensação**

**Verificar desmame da sedação**

## BUNDLE DE ITU

**Infecção de Trato Urinário**



**Higiene das mão**

**CVD deve está fixado**

**Manter circuito fechado na realização de procedimento com o paciente**

**Realizar higiene do meato uretral 3x/dia**

**Trocar CVD quando houver grumos e/ou sangue**

**Desprezar o CVD de forma asséptica**

**Verificar a necessidade do cateter**